

Com treballem?

- Seguiment conjunt amb l'ASSIR.
- Cribratge de preeclàmpsia al primer trimestre.
- Reavaluació del risc al segon trimestre.
- Seguiment individualitzat en el cas de les gestants amb alt risc de preeclàmpsia.
- Ecografia a la consulta especialitzada a les 28 i 32 setmanes .
- Atenció telemàtica durant tota la gestació.

Si tens cap dubte, contacta'ns a:
preeclampsia@santpau.cat



Servei de Ginecologia
i Obstetrícia de
l'Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau



www.santpau.cat

Salut/ Institut Català
de la Salut
Gerència Territorial
de Barcelona

Cribratge de Preeclàmpsia



Cuidem allò que
més estimes!

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
ASSIR Dreta

Què és la preeclàmpsia?

És una malaltia multisistèmica que afecta un 2-8% de les embarassades. Es dona en la segona meitat de la gestació i, habitualment, és més greu com més precoç és la seva aparició.




Com avaluem el risc?

CARACTERÍSTIQUES INDIVIDUALS I ANTECEDENTS



TENSIÓ ARTERIAL



ANALÍTICA DE PRIMER TRIMESTRE



MARCADORS ECOGRÀFICS



Tinc un risc alt de preeclàmpsia, què he de fer?

El tractament amb aspirina a dosis baixes (150mg/24h, per la nit), pot prevenir fins a un 82% de les preeclàmpsies d'aparició precoç i fins a un 62% de les preeclàmpsies que es donen abans del terme (abans de les 37 setmanes). És un tractament que cal seguir fins a les 36 setmanes d'embaràs.

A la consulta del primer trimestre t'explicarem el seguiment recomanat en el teu cas. Habitualment farem un seguiment conjunt amb el teu ASSIR i revaluarem el risc a l'ecografia morfològica.

També t'oferirem dues ecografies addicionals, cap a les 28 i 32 setmanes, a la nostra consulta especialitzada de preeclàmpsia. Podràs també consultar qualsevol dubte que tinguis al correu electrònic de la Unitat.

Puc desenvolupar una preeclàmpsia?

Algunes gestants, segons les seves característiques individuals, poden tenir més risc de desenvolupar una preeclàmpsia. En altres casos la malaltia apareix sense cap factor predisposant. Per això és important fer un cribratge de preeclàmpsia durant el primer trimestre.

Quins són els símptomes?

En la gestant pot donar hipertensió, mal de cap, molèsties abdominals i alteracions visuals. En la criatura, la manifestació més característica és el retard de creixement.

Recerca a DonaSantPau

La preeclàmpsia i el risc cardiovascular al llarg de la vida és una de les línies d'investigació principal al nostre centre. Per ampliar el coneixement i millorar la nostra tasca assistencial impulsem i participem en diversos estudis sobre aquesta patologia. Pots consultar al codi QR els estudis que tenim

en curs. És probable que et demanem la teva ajuda en algun moment!

